

AGITA[®] 10 WG

Biocida de Uso veterinário

Para controlo de moscas domésticas (*Musca domestica*) em instalações pecuárias e escaravelho da cama (*Alphitobius diaperinus*) em explorações avícolas

Composição	10% p/p	Tiametoxam
	0.05% p/p	(Z)- 9 Tricoseno
	q.b.p. 100% p/p	Excipientes

Modo de aplicação

AGITA[®] 10 WG é uma formulação para aplicação através de pincelagem e pulverização. Tem uma persistência de 6 semanas (42 dias) a menos que o produto tenha sido completamente consumido.

AGITA[®] 10 WG pode ser aplicado de 4 formas:

1) Como uma pintura para paredes e tetos no interior de explorações contra moscas domésticas.

Misture e agite a quantidade indicada de Agita[®] 10 WG no volume correspondente de água morna num recipiente separado até que seja obtida uma tinta pincelável.

Por 100 m² de parede / teto, pintar cerca de 20 "pontos" (aproximadamente 10 x 30 cm), onde as moscas se juntam ou poeiram, por exemplo: áreas quentes da parede, muretes dos parques, postes, molduras das janelas, canos, fora dos comedouros etc.

AGITA [®] 10WG como pintura			
100 g	250 g	400 g	1 kg
em 80 ml água	em 200 ml água	em 320 ml água	em 800 ml água
80-120 m ² parede/teto ⁽¹⁾	200-300 m ² parede/teto ⁽¹⁾	320-480 m ² parede/teto ⁽¹⁾	800-1200 m ² parede/teto ⁽¹⁾
20 pontos	50 pontos	80 pontos	200 pontos

(1)Equivalente a 40, 100, 160, e 400 m² de área de superfície de edifício, respetivamente

2) Em placas penduradas - Aplicada na superfície de placas que depois são suspensas dentro das casas dos animais contra moscas domésticas

Em edifícios onde a superfície é insuficiente para a pintura ou onde uma ligeira descoloração é inaceitável, devem-se pintar tiras de papelão, madeira ou placas leves e pendurá-los no teto. Misture e agite a quantidade indicada do Agita ® 10 WG no volume correspondente de água morna num recipiente separado até que seja obtida uma tinta pincelável. Aplicar a tinta nas placas para pendurar de cerca de 20x30 cm ou tamanho A4. Pendure até 10 placas / cartões por 100 m² de parede / teto.

AGITA® 10WG aplicado em placas penduradas			
100 g	250 g	400 g	1 kg
em 80 ml água	em 200 ml água	em 320ml água	em 800 ml água
80-120 m ² parede/teto ⁽¹⁾	200-300 m ² parede/teto ⁽¹⁾	320-480 m ² parede/teto ⁽¹⁾	800-1200 m ² parede/teto ⁽¹⁾
10 placas penduradas (tamanho A4)	25 placas penduradas (tamanho A4)	40 placas penduradas (tamanho A4)	100 placas penduradas (tamanho A4)

⁽¹⁾ Equivalente a 40, 100, 160, e 400 m² de área de superfície de edifício, respetivamente

3) Como uma aplicação de pulverização de baixa pressão para paredes e tetos no interior dos pavilhões contra moscas domésticas

Misture e agite a quantidade indicada do Agita ® 10 WG no volume correspondente de água morna num recipiente separado. Para ser pulverizado onde as moscas se juntam ou poisam, por exemplo, áreas quentes de parede, muretes dos parques, postes, molduras das janelas, canos, fora dos comedouros etc. Pulverize aprox. 1/3 das paredes / teto. Ao pulverizar, devem ser tomados os cuidados para apenas tratar locais fora do alcance de animais. Não pulverize diretamente os animais, rações e fornecimentos de água nem equipamentos de ordenha.

AGITA® 10WG como pulverização			
100 g	250 g	400 g	1 kg
em 800 ml água	em 2000 ml água	em 3200 ml água	em 8000 ml água
40-60 m ² parede/teto ⁽¹⁾	100-150 m ² parede/teto ⁽¹⁾	160-240 m ² parede/teto ⁽¹⁾	400-600 m ² parede/teto ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Equivalente a 20, 50, 80, e 200 m² de área de superfície de edifício, respetivamente

4) Como uma pulverização de baixa pressão nas camas, debaixo dos comedouros em explorações avícolas contra o escaravelho da cama

Misture e agite a quantidade indicada do Agita ® 10 WG no volume correspondente de água morna num recipiente separado.

Direção Geral de Alimentação e Veterinária – DSMDS

Última revisão do texto 20 de janeiro de 2015

Página 2 de 6

Em explorações avícolas, antes do repovoamento, em cada alimentador aplicar 500 ml da suspensão para pulverização já misturada por metro quadrado de três centímetros de espessura de material de cama.

AGITA® 10WG como pulverização			
100 g	250 g	400 g	1 kg
em 800 ml água	em 2000 ml água	em 3200 ml água	em 8000 ml água
16 comedouros ⁽¹⁾	40 comedouros ⁽¹⁾	64 comedouros ⁽¹⁾	160 comedouros ⁽¹⁾

(1) Ex. debaixo dos comedouros com diâmetro de 34 cm: aplicar 50 ml por cama.

Precauções de utilização

Utilizar a suspensão de AGITA 10 WG no dia da mistura. Não tratar paredes sujas, muito porosas ou recentemente caiadas para prevenir falta de eficácia a longo termo.

Rotulagem de acordo com o Regulamento (EC) mº 1272/2008:

Pictogramas de perigo:



Palavra sinal: Atenção

Advertências de precaução:

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros

Advertências de perigo:

P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

P102 Manter fora do alcance das crianças

P103 Ler rótulo antes da utilização

P273 Evitar libertação para o ambiente

P391 Recolher o produto derramado.

P501 Eliminar o conteúdo/ recipiente em instalação de incineração aprovada.

Componentes perigosos: Tiametoxam

Segurança do operador (na manipulação e controlo de exposição)

Devem ser tomadas medidas para minimizar a exposição dos operadores.

Evite a formação de pó. Evite o contacto com a pele, olhos e roupa. Evite inalar o pó.

É proibido fumar, comer e beber no local de aplicação.

Utilize luvas, óculos de proteção, máscara de pó eficaz, roupa de trabalho de algodão forte ou tecido sintético (ex. fatos macaco). Tomar duche ou banho no final do trabalho. Limpar regularmente o equipamento protetor, local de trabalho e vestuário.

Segurança do consumidor e ambiente

Perigoso para abelhas. Evite perdas para o ambiente. Não deitar fora os restos da mistura em lagos, correntes ou sistemas de esgotos. Muito tóxico para os organismos aquáticos. Pode causar efeitos adversos a longo prazo para o ambiente aquático.

Em caso de acidente contactar Centro de Informação Antiveneno Telf, 808 250 143

Medidas de primeiros socorros

Conselhos gerais: Retirar a pessoa afetada da zona de perigo para uma zona bem ventilada ou para o ar livre e proteger do arrefecimento.

Inalação	Retirar imediatamente para o ar livre.
Contacto com a pele	Remover roupas e calçado contaminados e lavar cuidadosamente as partes do corpo afetadas com água e sabão.
Contacto com os olhos	Lavar os olhos com água corrente durante vários minutos e chame imediatamente um médico
Ingestão	Se ingerido, procure imediatamente ajuda médica e mostre esta embalagem ou rótulo
Notas para o médico	Não existe nenhum caso humano registado. Não se conhece antídoto específico. Adotar terapia sintomática.

Recomendações gerais

Utilize os biocidas de forma segura. Leia sempre os rótulos e a informação de produto antes de utilizar. Remover alimentos não protegidos antes da aplicação. Não trate superfícies com que as pessoas contactam frequentemente. Evite o contacto com as superfícies tratadas até que estejam secas. **Aplicar sempre fora do alcance das crianças e animais.**

Gestão das resistências

O Agita 10WG contém a substância ativa tiametoxam, um inseticida eficaz contra adultos do Grupo 4A. Para retardar o desenvolvimento de resistências, evitar o uso repetido exclusivo de inseticidas do mesmo Grupo. Alternar com produtos de outros Grupos, ex. larvicidas.

Condições de armazenamento

Manter afastado de alimentos, bebidas e alimentos dos animais.

Temperatura de armazenagem: min. 2°C – max. 30°C.

Outras informações: Conservar o produto na embalagem de origem. Proteger da luz e da humidade. Manter fora da vista e do alcance das crianças.

Eliminação

Caso não existam requisitos legais locais ou outras regras no sentido contrário, recomenda-se o seguinte procedimento:

Produto: Eliminar o produto e as placas penduradas tratadas num incinerador aprovado para químicos. O produto derramado não poderá ser reutilizado e deve ser eliminado. Se não for possível eliminar de forma segura, contactar o fabricante, comercializador ou representante local. Levantar e transferir para contentores devidamente identificados.

Embalagens contaminadas: Eliminar os contentores vazios num incinerador aprovado para químicos. Coloque os recipientes originais em contentores maiores, devidamente identificados.

Verifique possibilidade de reciclar os contentores maiores vazios, tambores e barris.

Nota: cumprir SEMPRE os requisitos legais locais.

Responsabilidade

O utilizador corre o risco de danos resultantes de fatores que estão para além do controlo do fabricante. O fabricante declina qualquer responsabilidade por danos resultantes de armazenamento ou utilização incorreta do produto.

MANTER FORA DA VISTA E DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Lote nº

Válido até:

ACM n.º. 1/2004/DGV

Conteúdo líquido: 250g

Responsável pela Autorização de Introdução no Mercado

Novartis Farma – Produtos Farmacêuticos, S.A.
Avenida Professor Doutor Cavaco Silva, n.º 10E,
Taguspark, 2740-255
Porto Salvo

Marca registada de Novartis AG. Basileia, Suíça

Símbolo do “Ponto Verde”

Fabricante
Kwizda Agro GmbH
Kwizda Allee 1
A-2100 Leobendorf
Áustria

Uso profissional