

Descrição

O INTERCID[®] é um desinfetante e um agente de limpeza para instalações de animais.

Aplicações

- Agente de limpeza altamente eficaz com eficácia comprovada contra bactérias, fungos e vírus (revestidos e não revestidos).
- Pode ser utilizado em instalações ocupadas, se aplicado convenientemente.
- Eficaz no combate aos agentes causadores das seguintes doenças:
 - **Suínos:** Febre suína, Doença de Aujeszky, desintéria, Parvovirose porcina, enterotoxemia, FMD, doença da vesícula dos suínos;
 - **Bovinos:** Febre aftosa, IBR/IPV, BVD/MD, influenza bovina;
 - **Aves:** Doença de Marek, Gumboro, New Castle, Salmonelose, Bronquite infecciosa, Pasteurelose, Corisa aviária, Rinotraqueíte aviária;
 - **Equinos:** Influenza, Artrite infecciosa, Garrotilho, Poliartrite dos poldros e Salmonelose;
 - **Pequenos animais:** Parvovirose, Esgana felina (Panleucopenia), Rinotraqueíte felina, Leucose felina, Peritonite infecciosa felina, Esgana canina e Raiva.

Instruções de utilização

O INTERCID[®] é uma solução concentrada destinada a ser diluída em água. A solução pronta-a-usar pode aplica-se por pulverização utilizando pulverizadores de alta pressão, numa proporção de 200 a 300ml por m² e bocal de jato de ângulo largo para 300 a 1000psi ou esfregando as superfícies deixando-as húmidas.

Procedimento recomendado:

- ✓ Retire os animais
- ✓ Trate as instalações contra escaravinhos (se necessário)
- ✓ Retire os detritos das camas dos animais e o equipamento portátil
- ✓ Limpe a seco as instalações
- ✓ Limpe cuidadosamente com detergente, com uma máquina de limpeza de alta pressão
- ✓ Deixe secar (pelo menos 3 horas)
- ✓ Volte a encher os pedilúvios ou tapetes e feche as portas das instalações, respiradouros, etc.
- ✓ Em caso de problemas de coccidiose, trate o chão e as paredes até 2 m de altura com INTERKOKASK[®] a 3% e deixe secar durante 3 horas. Aplique em seguida INTERCID[®].
- ✓ Pulverize com INTERCID[®] o chão, paredes, tetos, ventiladores, entradas de ar, comedouros, bebedouros e equipamento que se encontram nas instalações desocupadas.
- ✓ Deixar secar durante pelo menos 2 horas ou, de preferência, de um dia para o outro.
- ✓ Prepare as instalações para voltar a introduzir os animais

Instruções de utilização

Desinfecção profilática: em instalações ocupadas, pulverizar as superfícies exteriores dos estábulos, passagens, corredores e equipamentos, 3 vezes por semana.

Desinfecção específica: em instalações vazias, pulverizar o chão, paredes e equipamentos, 2 vezes por semana.

Desinfecção de rotina: Renove os pedilúvios pelo menos uma vez por semana ou mais vezes se contaminados com matéria orgânica.

Dosagem e diluição

SOLUÇÃO PRONTA-A-USAR A 1%: Diluir 100ml de INTERCID[®] em 10 litros de água

Ação	Tipo de desinfecção	Tempo de exposição	Solução pronta a usar
Bactericida	Profilática	1 hora	0,5 %
Bactericida	Específica	2 horas	1,0 %
Fungicida		2 horas	1,0 %
Virucida	Efeito virucida limitado	1 hora	1,0 %
Virucida	Efeito virucida	2 horas	1,0 %

Composição

140g de formaldeído e 100g de glutaraldeído por cada Kg de concentrado líquido.

Embalagem

5 e 10 Kg

Armazenamento

Manter o recipiente bem fechado fora do alcance e da vista das crianças. Guardar longe de alimentos, bebidas e rações. Conservar sempre no recipiente original. Proteger da geada.

Validade

3 anos

ACM n.º

011/00/08 NBVPT

Ref.ª

5005 / 5111