

FICHA TÉCNICA

Ecocid S

Abril 2013

1/4

NOME COMERCIAL

Ecocid S

Desinfetante com actividade bactericida, fungicida e viricida. Biocida de uso veterinário.

COMPOSIÇÃO

Bis(peroximonosulfato) bis(sulfato) de pentapotássio 50g;
Excipientes q.b.p. 100g.

FORMA FARMACÊUTICA

Pó solúvel em água para desinfecção.

- Produto biocida para desinfecção de instalações pecuárias;
- Desinfetante de superfícies nas indústrias agro-alimentares.

ESPÉCIES ALVO

Todos os tipos de instalações pecuárias.

INDICAÇÕES

O Ecocid S devido ao seu elevado nível de segurança e amplo espectro de actividade biocida pode ser utilizado para diversos fins:

- **Instalações veterinárias:** (explorações pecuárias, clínicas e laboratórios), o Ecocid S é usado para desinfetar todas as superfícies e equipamento onde a destruição segura e eficaz de vírus, bactérias gram-positivas e gram-negativas é necessária.

- **Instalações pecuárias e de alojamento animal:** o Ecocid S é usado para desinfetar todas as superfícies e equipamentos em estábulos, canis, gaiolas para coelhos, gaiolas, colmeias de outras instalações para animais na ausência dos mesmos.

- **Desinfecção de veículos, matadouros, superfícies e equipamentos das indústrias agro-alimentares.**

O Ecocid S é um pó concentrado, utilizado após diluição sob a forma de spray, nebulização, imersão, pedilúvios e rodilúvios.

Abril 2013	FICHA TÉCNICA Ecocid S	2/4
------------	---	-----

MODO DE EMPREGO E DOSES DE APLICAÇÃO

Utilização	Diluição*	Instruções de utilização
Desinfecção final de superfícies previamente limpas	1:100 (1%)	Deixar actuar a solução durante 30 minutos nas superfícies e enxaguar de seguida abundantemente com água potável
Desinfecção final em instalações pecuárias ou locais de alojamento dos animais e equipamentos	1:100 (1%)	Aplicar a solução de trabalho em superfícies previamente limpas utilizando um pulverizador de baixa pressão ou outro pulverizador mecânico, na dose de 300ml/m ² . Após 30 a 60 minutos, enxaguar abundantemente com água e, quando as superfícies estiverem secas realojar os animais
Pedilúvios e rodilúvios		
Desinfecção aérea: Nebulização fria	1:100 (1%)	Nebulizar as instalações vazias (estábulo) usando um nebulizador mecânico, na dose de 1 litro/10 m ² de área e deixar atuar durante 30 minutos. Ventilar as instalações durante 30 a 60 minutos antes de realojar os animais.
Desinfecção aérea Nebulização térmica	1:25 (4%)	Comece por misturar o nebulizador com água na proporção de 15 partes de nebulizador para 85 partes de água. Adicionar o Ecocid S à solução. Nebulizar as instalações (estábulo), utilizando um equipamento de nebulização térmica na dose de 1 litro/40 m ² de área e deixar atuar durante 30 a 60 minutos. Ventilar as instalações durante 30 a 60 minutos antes de realojar os animais.

***Preparar uma solução de Ecocid S 1%:** Dissolver o conteúdo de uma saqueta de 1 kg de Ecocid S em 100 litros de água.

PRECAUÇÕES A TOMAR PELA PESSOA QUE ADMINISTRA O PRODUTO

Ter em atenção aos cuidados referidos nas medidas de segurança. O produto não deve entrar em contacto com a pele e membranas mucosas. O contacto accidental com a pele pode causar irritação desta. Remover a roupa contaminada da área afetada e lavar a pele com água em abundância. Se após a lavagem a irritação persistir, consultar o médico.

FICHA TÉCNICA

Abril 2013.

Ecocid S

3/4

Em caso de inalação que resulte em irritação respiratória, remover a vítima para um local com ar fresco. Caso ocorram sintomas de tosse, dificuldades respiratórias e sibilos, que causem incômodos, ou a recuperação não seja rápida, consultar o médico.

O contacto com os olhos pode causar danos. Lavar os olhos abundantemente com água ou solução salina para lavagem de olhos, durante pelo menos 15 minutos com as pálpebras abertas e consultar o médico.

A ingestão accidental pode causar perturbações gastrointestinais. Não induzir o vômito. Lavar a boca com água em abundância. Se a vítima estiver consciente deverá beber bastante água. Consultar um médico imediatamente.

MEDIDAS DE SEGURANÇA

Usar equipamento a calçado de proteção, luvas de borracha e óculos de segurança ou máscara facial durante o manuseamento do produto.

Manter a embalagem original bem fechada e protegida da humidade, a uma temperatura inferior a 30°C. Manter afastado de materiais combustíveis e fora do alcance e vista das crianças.

Recomenda-se que o conteúdo de uma saqueta de Ecocid S, uma vez aberta, seja utilizado na totalidade.

Enxaguar com água limpa os dispositivos utilizados durante a desinfecção (pulverizadores, aspersores, nebulizadores) após utilização.

APRESENTAÇÃO

Embalagens de 50g, 25x50g, 1kg e 2,5kg.

PRECAUÇÕES ESPECIAIS PARA ELIMINAÇÃO DOS PRODUTOS NÃO UTILIZADOS OU DOS DESPERDÍCIOS DERIVADOS DESSES PRODUTOS

Eliminar os resíduos do produto e respetivas embalagens de acordo com os requisitos legais para tratamento de resíduos.

PRAZO DE VALIDADE

5 anos a partir da data de fabrico

vetlima

FICHA TÉCNICA

Abril 2013

Ecocid S

4/4

RESPONSÁVEL PELO FABRICO

KRKA, d.d., Novo mesto
Smarjeska cesta 6
8501 Novo mesto
ESLOVÉNIA

NÚMERO DE REGISTO

ACM nº 115/00/13NBVPT

RESPONSÁVEL PELA INTRODUÇÃO NO MERCADO E COMERCIALIZAÇÃO

Vetlima, Sociedade Distribuidora de Produtos Agro-Pecuários, SA
Centro Empresarial da Rainha, Lote 27
2050-501 Vila Nova de Rainha
Tel: 263406570; Fax: 263406579
Email: geral@vetlima.com