

Embalagem primária (embalagens de 100 ml, 250 ml, 1 L e 5 L)**ARPON G****INSECTICIDA E ACARICIDA****BIOCIDA DE USO VETERINÁRIO****COMPOSIÇÃO.**

Cipermetrina	10%
Disolventes e excipientes q.b.p.	100%

INDICAÇÕES: ARPON G é um insecticida líquido emulsionável em água cujo princípio activo é a Cipermetrina para instalações pecuárias. Eficaz contra de moscas, pulgas, carraças e baratas.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DOSAGEM: ARPON G emprega-se diluído em água a 0.5-1% (equivalente a diluir 50-100 ml de ARPON G por cada 10 litros de água). Pulverizar em paredes, tectos, solos, janelas, numa dose equivalente a 5 litros de solução preparada por cada 100 m² de superfície para superfícies lisas e 10 litros de solução preparada por cada 100 m² para superfícies porosas. Antes de usar o produto leia detidamente o rótulo. Não deverá ser misturado com nenhum outro produto. Não tornar a utilizar embalagens. Eliminar as embalagens e resto de produto de forma segura. Não contaminar com restos do produto os esgotos ou as águas continentais (rios, lagos).

ARMAZENAGEM: Armazenar a temperatura ambiente.

USO PROFISSIONAL**Responsável pela colocação no mercado:**

UNIVETE S.A.

Rua D. Jerónimo Osório, 5-B, 1400-119

LISBOA

Telf.: 21 3041230

Fax: 21 3041233

e-mail: scomercias@univete.pt**Fabricante:**

LABORATORIOS ZOTAL S.L.

Ctra. Nac. 630 Km 809

41900 Cama (Sevilha). ESPAÑA

Telf. + 34 954 390204

faX: + 34 954 395516

www.zotal.com**ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA.**

Líquido e vapor inflamáveis. Provoca irritação cutânea. Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. Pode provocar sonolência ou vertigens. Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Manter fora do alcance das crianças. Manter afastado do calor, faísca, chama aberta ou superfícies quentes. Não fumar. Evitar respirar os vapores e aerossóis. Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. Usar luvas e vestuário de proteção. Em caso de exposição ou de indisposição: contacte imediatamente o CIAV – CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTI-VENENOS ou um médico. Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Evitar a libertação para o

ambiente. Recolher o produto derramado. Eliminar o conteúdo e/ou recipiente em conformidade com os regulamentos locais.

EFEITOS ADVERSOS E PRIMEIROS SOCORROS.

Primeiros socorros: Retire a pessoa da zona contaminada. Retirar a roupa manchada ou salpicada. Lavar os olhos com abundante água durante pelo menos 15 minutos. Não retirar as lentes de contacto. Lavar a pele com abundante água e sabão sem esfregar. Não administrar nada por via oral. Em caso de ingestão não provoque o vômito. Mantenha o paciente em repouso. Conserve a temperatura corporal. Controle a respiração. Se for necessário, respiração artificial. Se a pessoa estiver inconsciente, deita-la de lado com a cabeça mais baixa que o resto do corpo e os joelhos semi-flectidos. Transporte o intoxicado a um hospital, e sempre que seja possível levar o rótulo ou a embalagem.

NÃO DEIXE O INTOXICADO SÓZINHO EM NENHUM CASO.

A intoxicação pode produzir: Dermatite, irritação dos olhos, nariz, garganta. Reações de hipersensibilidade com broncospasmos. Náuseas, vômitos, vertigem, cefaleia, parestesias peribucais. Pneumonia por aspiração. Depressão SNC.

Conselhos terapêuticos: Em caso de ingestão, descontaminação digestiva de acordo com o estado de consciência. Administrar uma solução aquosa de carvão ativado e sulfato de sódio a uma catarse. Tratamento sintomático.

EM CASO DE INTOXICAÇÃO, CONTACTE O CIAV-CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTI-VENENOS: TELEFONE 808 250 143

ACM nº 025/00/09/NBVPT

LOTE E PRAZO DE VALIDADE. VER EMBALAGEM.

CONTEÚDO LÍQUIDO

PERIGO

