



CONTROL ARBUSTIVA

CONTROL ECONÓMICA

Retama sphaerocarpa	27%
Rosa canina	20%
Cistus salviifolius	15%
Cytisus scoparius	15%
Spartium junceum	15%
Erica australis	8%

CONTROL BIODIVERSIDADE

Retama sphaerocarpa	26%
Rosa canina	15%
Cytisus scoparius	15%
Cistus salviifolius	10%
Coronilla valentina	8%
Rosmarinus officinalis	8%
Ulex europaeus	8%
Erica arborea	5%
Lavandula stoechas	5%

CONTROL SUPERIOR

Retama monosperma	20%
Cistus salviifolius	15%
Arbutus unedo	13%
Erica arborea	10%
Rosa canina	10%
Crataegus monogyna	7%
Cytisus scoparius	5%
Erica scoparia	5%
Lavandula stoechas	5%
Myrtus communis	5%
Pistacia lentiscus	5%
Rosmarinus officinalis	5%
Ulex europaeus	5%

O que é BOSKGREEN CONTROL ARBUSTIVA?

São misturas standard de sementes de espécies arbustivas autóctones de Portugal Continental. As espécies incluídas são todas de carácter autóctone, isto é, são espécie de ocorrência espontânea no país, o que lhes confere um importante valor ecológico. São plantas com grande capacidade de adaptação ao meio, garantindo a sustentabilidade do ecossistema. É uma mistura ideal para o controlo de erosão dos solos, em substituição de plantas exóticas.

As misturas Boskgreen Control Arbustiva têm uma dose de sementeira aconselhada de 5-7 g/m². Devem ser semeadas em conjunto com uma mistura de herbáceas de implantação mais rápida.



Sementes de BOSKGREEN CONTROL ARBUSTIVA.

Sementeira BOSKGREEN CONTROL ARBUSTIVA.

Disponível em
embalagens de
10kg e 25 kg.



Bosk[®]green

Landscape Seed Solutions

CONTROL ARBUSTIVA

PERFORMANCE

Rapidez de Instalação
Duração da floração
Facilidade de Manutenção
Resistência à seca
Biodiversidade
Biomassa
Preço
Composição
Altura
Dose de Sementeira

CONTROL ECONÓMICA

🕒	🕒	🕒	🕒	🕒
🌸	🌸	🌸	🌸	🌸
✂️	✂️	✂️	✂️	✂️
☀️	☀️	☀️	☀️	☀️
⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
▲	▲	▲	▲	▲
€	€	€	€	€
100% Arbustivas				
80 - 100 cm				
5 -7 gr/m ²				

CONTROL BIODIVERSIDADE

🕒	🕒	🕒	🕒	🕒
🌸	🌸	🌸	🌸	🌸
✂️	✂️	✂️	✂️	✂️
☀️	☀️	☀️	☀️	☀️
⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
▲	▲	▲	▲	▲
€	€	€	€	€
100% Arbustivas				
100 - 150 cm				
5 -7 gr/m ²				

CONTROL SUPERIOR

🕒	🕒	🕒	🕒	🕒
🌸	🌸	🌸	🌸	🌸
✂️	✂️	✂️	✂️	✂️
☀️	☀️	☀️	☀️	☀️
⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
▲	▲	▲	▲	▲
€	€	€	€	€
100% Arbustivas				
100 - 150 cm				
5 -7 gr/m ²				

Espécies presentes em BOSKGREEN CONTROL ARBUSTIVA:

Retama shpaerocarpa



ÉPOCA DE FLORAÇÃO:
Abril - Julho

Sinónimo de Teline sphaerocarpa, vulgarmente chamada de piorno-amarelo ou giesta. É um arbusto ou árvore pequena, de flor amarela, que no máximo atinge 2-3 m. Pertencente à vasta família das leguminosas, é muito frequente vê-la em toda a Península Ibérica e NW de África.

Rosa canina



ÉPOCA DE FLORAÇÃO:
Abril - Julho

A roseira ou rosa-selvagem é um arbusto que vai dos 0,5 aos 3 m de altura. Ocorre em toda a Península Ibérica, excepto nas Baleares, na orla dos carvalhais e pinhais. As suas flores são brancas ou rosa-pálido e atraem inúmeros insectos. Muito ornamental e pouco exigente.

Pistacia lentiscus



ÉPOCA DE FLORAÇÃO:
Março - Maio

O lentisco ou aroeira é um arbusto ou pequena árvore da região Mediterrânica e Macaronésia, comum nos matagais do centro e sul do país, podendo atingir no máximo os 6 m de altura. Tem folhagem persistente, portanto mantém-se verde todo o ano. Tanto as suas flores como os seus frutos vermelhos são bastante ornamentais.

Erica arborea



ÉPOCA DE FLORAÇÃO:
Fevereiro - Agosto

A urze-branca é um arbusto ou árvore pequena já bastante cultivada tanto para fins ornamentais como pela sua madeira. Ocorre espontaneamente em clareiras de bosques ou em matos frescos e sombrios, em toda a Península Ibérica.

Cistus salvifolius



ÉPOCA DE FLORAÇÃO:
Maio - Julho

O sargancho-mouro ou sargaço é um arbusto de flores brancas e folhas levemente perfumadas que atinge no máximo 1 m de altura. Ocorre espontaneamente em matos de zonas baixas, pinhais e bosques de azinheira e sobreiro, em solos arenosos ou argilosos, descalcificados.

Rosmarinus officinalis



ÉPOCA DE FLORAÇÃO:
Janeiro - Maio

O alecrim é um arbusto muito versátil. É exclusivo da Região Mediterrânica e do Cáucaso, mas cultivada em todo o mundo. Mantém-se sempre verde e com bom aspecto ao longo de todo o ano. Ocorre espontaneamente em matos e formações arbóreas abertas, indiferente ao tipo de solo. Atrai insectos úteis e é também uma espécie melífera.

ATLANLUSI

Rua de Leiria, Casal Mil Homens
2440-231 Golpilheira
Batalha Portugal

T. (+351) 244 766 705
F. (+351) 244 767 204

bosk@atlanlusi.pt www.bosk.pt



CONTROLO DE
EROSÃO E AMBIENTE



Bosk[®]green
Landscape Seed Solutions

CONTROL ARBUSTIVA

Espécies presentes em BOSKGREEN CONTROL ARBUSTIVA:

Arbutus unedo



ÉPOCA DE FLORAÇÃO:
Outubro - Fevereiro

O medronheiro é arbusto, ou uma pequena árvore, muito conhecido em Portugal pelos seus frutos, os medronhos. Ocorre em carvalhais, desfiladeiros fluviais e zonas rochosas. Está amplamente distribuído por toda a Península Ibérica. As suas folhas são persistentes (mantêm-se todo o ano) de um verde-escuro brilhante, e as suas flores brancas ou levemente rosadas, quando surgem no Outono, são muito decorativas.

Crataegus monogyna



ÉPOCA DE FLORAÇÃO:
Abril - Maio

O pirliteiro é um arbusto, às vezes arborescente, espinhoso. As suas flores são brancas e atraem inúmeros insetos e pássaros, daí ser utilizado como sebe em campos agrícolas. Adaptado a solos com fraca drenagem. Tem inúmeras variedades de cultivo ornamental.

Coronilla valentina



ÉPOCA DE FLORAÇÃO:
Março - Julho

As famosas pascoínhas, são leguminosas perenes, sub-arbustivas, de flores abundantes de cor amarelo-vivo. Nativas da Região Mediterrânica, não ultrapassam 1,5 m. Cultiva-se maioritariamente como ornamental em taludes secos e soalheiros.

Myrtus communis



ÉPOCA DE FLORAÇÃO:
Abril - Julho

A murta identifica-se facilmente pelo seu cheiro característico. Este arbusto perene bastante ramificado, mede 1-5 m no máximo. Ocorre principalmente nas zonas costeiras mediterrânicas e está bem distribuída por todo o quadrante Sudoeste e Litoral Mediterrânico. Principalmente em matos de carrascos, aroeiras, silvas, entre outros.

Retama monosperma



ÉPOCA DE FLORAÇÃO:
Março - Agosto

A retama-branca (ou piorno-branco) é um arbusto, ou árvore pequena, de 1,5 a 3 m no máximo. É uma leguminosa e distribui-se pela Ibérica e Norte de África, fundamentalmente em zonas costeiras sobre solos arenosos, pois são resistentes a ambientes salinos e até ajudam na sustentação de dunas. É uma planta ornamental, usada na recuperação de taludes em zonas secas.

Cytisus scoparius



ÉPOCA DE FLORAÇÃO:
Abril - Junho

É a giesteira-das-vassouras, um arbusto com ramos verdes e angulosos, com folhas pequenas e alternas. As suas flores amarelas são muito ornamentais. Toda a planta é tóxica. Cresce nas encostas ensolaradas, na orla das florestas, formando frequentemente matagais.

Lavandula stoechas



ÉPOCA DE FLORAÇÃO:
Fevereiro - Julho

É uma espécie de romaninho (ou alfazema), muito ornamental, e tal como os restantes, bastante aromática. É um sub-arbusto perene, de pequeno porte, de flores terminais violeta-arroxeadas, que ocorre naturalmente na Região Mediterrânica.

Ulex europaeus



ÉPOCA DE FLORAÇÃO:
Fevereiro - Junho

Vulgarmente chamado de carqueja ou tojo, é um arbusto erecto com 1 a 3 metros de altura, com ramos espessos cobertos de espinhos. As flores são grandes e amarelas, presentes na maior parte do ano. Excelente enraizamento, daí dominarem ambientes degradados com rapidez. As sementes têm viabilidade no solo por mais de 30 anos.

Erica scoparia



ÉPOCA DE FLORAÇÃO:
Dezembro - Agosto

Urze-das-vassouras é um arbusto erecto, ou uma pequena árvore, que atinge, no máximo, os 4-5 m de altura. As suas folhas são pequenas, lineares e resistentes. As flores, reunidas em cachos estreitos, alongados ou terminais, são pequenas, amarelo-esverdeadas e em forma de sino. Distribui-se por todo o país, em matos, pinhais, urzais e outeiros não calcários.

ATLANLUSI

Rua de Leiria, Casal Mil Homens
2440-231 Golpilheira
Batalha Portugal

T. (+351) 244 766 705
F. (+351) 244 767 204

bosk@atlanlusi.pt www.bosk.pt



CONTROLO DE
EROSÃO E AMBIENTE