

Fumagri[®] HA

Desinfecção de superfícies por via aérea

UTILIZAÇÃO:

Uso Biocida (tipo de produto 3 e 4 FEED): Desinfectante fungicida (bolores e leveduras) e bactericida.

TP03: Instalações e equipamentos de criação e engorda de animais e equipamento de transporte de animais.

TP04: Instalações e equipamento e de produção, armazenamento e transporte de alimentos para animais.

INDICAÇÕES:

Desinfecção de superfícies por via aérea.

- Locais de reprodução: desinfecção contra *Salmonella* e outras Enterobactérias, Estafilococos, Enterococos, *Listeria* e *Pseudomonas*. Prevenção contra os fungos da *Aspergillus*.
- Incubadoras : desinfecção contra *Salmonella* e outras Enterobactérias. Prevenção contra os fungos da *Aspergillus*.
- Silos : desinfecção contra *Salmonella* e outras Enterobactérias. Prevenção de bolores e de formação de micotoxinas

MODO DE ACÇÃO:

Bactericida/Fungicida

Ver tabelas EFICÁCIA segundo a norma NF T 72-281. provando a eficácia bactericida-fungicida com uma dose de 32 mg de HA/m³.

O produto FUMAGRI[®] HA liberta, no espaço a tratar, na ausência de qualquer operador, uma matéria desinfectante (Ácido Hidroxiacético) que actua sobre as bactérias na sua forma vegetativa, as leveduras e os bolores.

SUBSTÂNCIA ACTIVA:

Ácido Hidroxiacético

HOMOLOGAÇÃO:

Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária: ACM n°106/00/12NBVPT

Direcção-Geral de Saúde (para utilizações que não “uso veterinário”): registo efectuado em Novembro de 2011.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

- ♦ Tratar sem a presença de pessoas, plantas e animais.
- ♦ Tratar sem a presença de géneros alimentícios e alimentos para animais não embalados.
- ♦ Distribuir o número de latas fumígenas, correspondente ao volume, de espaço a tratar, pelo no chão, sobre num suporte resistente ao calor e ao fogo.

- ♦ Descompactar o pó, agitando a lata antes da abertura.
- ♦ Abrir a lata e acender a mecha, começando pelas que se encontram mais afastadas da saída.
- ♦ Manter o local fechado durante 4 a 15 horas antes de o reutilizar.
- ♦ Ventilar ou arejar os locais com ar fresco.
- ♦ Eliminar os resíduos.

SECURITE :

- ♦ **FUMAGRI® HA** não é classificado no sentido da directiva 1999/45/CE modificada
- ♦ Informações de segurança:
 - ♦ Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista.
 - ♦ Não respirar os fumos
 - ♦ Consultar a Ficha de Dados de Segurança e as instruções no rótulo do produto
 - ♦ Consultar o seu fornecedor e seguir as suas recomendações específicas.

Segurança do Aplicador

- Sem exposição de quem aplica, o produto difunde-se de forma autónoma.
- Usar luvas na remoção das doses utilizadas.

Segurança do Operador

- Em locais normalmente ventilados: sem exposição do operador.
- Em locais não ventilados e confinados: consultar o seu fornecedor.

EFICÁCIA POR TRATAMENTO PONTUAL:

à dose nominal de 1 g/m³

♦ **Espectro bactericida**

Eficácia exigida: redução de 5 unidades logarítmicas

SEGUNDO A NORMA NF T 72 281 - dose de 1 g/m ³ - 15 horas de tempo de contacto		
ESTIRPE TESTADA	EFICÁCIA OBTIDA	Referência do ensaio
<i>Escherichia coli</i> - IP 54 127	7,4*	IRM - relatório n°3930910-3
<i>Listeria monocytogenes</i> - IP 103.321	5,6	IPL - relatório n°1371206(4)
<i>Staphylococcus aureus</i> - IP 4 83	7,07*	IRM - relatório n°2220511-1
<i>Salmonella serotype enteritidis</i> - IP 56.29	6,9	IPL - relatório n°1371206(2)
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> - IP 103 467	6,3*	IRM - relatório n°3930910-1
<i>Enterococcus hirae</i> - IP 58 55	7,34*	IRM - relatório n°2220511-2

(*): Eficácia obtida para um tratamento de 0.8 g/m³

♦ Espectro fungicida

Eficácia exigida: redução de 4 unidades logarítmicas

SEGUNDO A NORMA NF T 72 281 - dose de 1 g/m ³ - 15 horas de tempo de contacto		
ESTIRPE TESTADA	EFICÁCIA OBTIDA	Referência do ensaio
<i>Aspergillus niger</i> - ATCC 16 404	6,8*	IRM - relatório n°3930910-6
<i>Candida albicans</i> – ATCC 10231	6.2*	IRM – relatório n°3930910-5
<i>Eurotium repens</i> – Estirpe selvagem	>4.6*	LCB – relatório n°PE5007109
<i>Absidia corymbifera</i> IP 1129-75	6.6	IRM- relatório n°1610307-7
<i>Aspergillus versicolor</i> IP 1187-79	6.1	IRM-relatório n°1610307-6
<i>Cladosporium cladosporioides</i> - IP 1232.80	5,1	IRM - relatório n°1610307-5
<i>Candida pelliculosa</i> – Estirpe selvagem	>4.8	LCB – relatório n°2010/09
<i>Geotrichum candidum</i> – IP 285-54	4.08	LCB – relatório n°2010/10
<i>Penicillium verrucosum</i> var. <i>cyclopium</i> IP 1186.79	4.56	LCB – relatório n°2010/11
<i>Penicillium candidum</i> – Estirpe selvagem	>5.83	LCB- relatório n°2010/13

(*): Eficácia obtida para um tratamento de 0.8 g/m³

EMBALAGEM:

Designação	Fornecimento	Volume a tratar
FUMAGRI [®] HA 16g	Caixa de 24 latas	20 m ³
FUMAGRI [®] HA 40g	Caixa de 12 latas	50 m ³
FUMAGRI [®] HA 80g	Caixa de 18 latas	100 m ³
FUMAGRI [®] HA 200g	Caixa de 12 latas	250 m ³
FUMAGRI [®] HA 400g	Caixa de 6 latas	500 m ³
FUMAGRI [®] HA 1000g	Caixa de 4 latas	1250 m ³

Rótulo verde

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Pó fumigante de cor branca.

ARMAZENAGEM/DATA LIMITE DE UTILIZAÇÃO:

Armazenagem: Até 2 anos em local seco

Validade: 2 anos

Todas as informações técnicas incluídas no presente documento baseiam-se em dados técnicos actualmente disponíveis, que a LCB considera fiáveis.

Destinam-se a todos os utilizadores com experiência, agindo a seu exclusivo critério e por sua própria conta e risco.

As precauções de manuseamento contidas neste documento são fornecidas partindo do princípio que os utilizadores garantirão previamente que as condições particulares de utilização não representam qualquer risco para a saúde ou para a segurança.

A partir do momento em que as condições de utilização escapem ao nosso controlo, renunciamos a qualquer garantia, expressa ou implícita, nesta matéria e renunciamos a qualquer responsabilidade que derive da utilização destas informações.