Rotulagem Primária (Embalagens de 1L, 5L e 25 L)

SANITAS FORTE VET

O produto SANITAS FORTE VET é uma solução concentrada de contacto direto, com propriedades bactericidas, fungicidas e virucidas, destinada à industria agro-alimentar, a utensílios (ex. Utensílios utilizados na industria agro-alimentar, máquinas utilizadas na industria agro-alimentar, meios de transporte de animais e matadouros.

MODO DE EMPREGO.
Antes de utilizar o produto, ler atentamente o rótulo. O produto deve ser aplicado na dosagem recomendada, deixando atuar pelo menos durante 30 minutos ante de se enxaguar as superfícies. Os utensílios ou maquinaria podem ser desinfetados por imersão numa solução na dose recomendada de produto, durante um mínimo de meia hora, e enxaguado seguidamente, com água abundante, se as suas dimensões o permitirem, ou então podem ser desinfetados por pulverização. Diluir o produto em água fria, utilizando o copo doseador que acompanha a embalagem, nas seguintes proporções.

Atividade bactericida: 1:250 (40 ml de SANITAS FORTE VET em 10 L de água), 5 minutos.
Atividade fungicida: 1. 250 (40 ml de SANITAS FORTE VET em 10 L de água), 15 minutos.
Atividade virucida (enterovirus Bovino Tipo I): 1:50 (200 ml de SANITAS FORTE VET em 10 lt. de água), 30 minutos.

Locais e recintos:
- Desinfeção de rotina: 1.250 (40 ml de SANITAS FORTE VET em 10 L de água).
- Desinfeção normal: 1:250. (40 ml de SANITAS FORTE VET em 10 L de água).
- Desinfeção aérea: 1.200 (50 ml de SANITAS FORE VETE em 10 L de água).

Utensílios: 1:200 (50 ml de SANITAS FORTE VET em 10 L de água).

Meios de transporte: 1:200 (50 ml de SANITAS FORTE VET em 10 L de água). Aplicar nas seguintes proporções:
- 100 ml de diluição por m^2 em superfícies não porosas.
- 300 ml de diluição por m^2 em superfícies porosas.

PRECAUÇÕES.
Não aplicar sobre alimentos ou animais. Devem-se tomar todas as medidas necessárias para que os alimentos e utensílios que sejam manipulados nos locais ou instalações tratadas previamente com este produto não contenham resíduos de nenhum dos seus ingredientes ativos. Para tal, deve-se enxaguar com água as partes tratadas antes da sua utilização. Após a desinfeção por pulverização deve observar-se um prazo de segurança de 3 horas e ventilar adequadamente o recinto. Limpar adequadamente o equipamento de ventilação. Não deverá misturar-se com nenhum produto químico. Incompatível com detergentes aniónicos, aminas, fosfatos e outros produtos oxidantes.
Em caso de incêndio, utilizar spray de água, espuma ou agentes químicos secos. Se ocorrer derrame acidental, recolher com material absorvente (areia, material de infusórios) e diluir com água abundante.
Não reutilizar a embalagem. Evitar a libertação para o ambiente.

Fabricado por:
LABORATORIOS ZOTAL S.L.
SEVILHA- ESPANHA.

SANITAS FORTE VET
Com agente humectante

ATIVO CONTRA: BACTÉRIAS, FUNGOS e VIRUS

Composição: Glutaraldeído 14%; Didecil dimetil cloreto e amónio 10%; Excipientes q.b.p 100%

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

ACM nº 009/00/08NBVPT

Responsável pela colocação no mercado: UNIVETE, S.A., Rua D. Jerónimo Osório, 5-b 1400-119 LISBOA ,elf.: 21 3041230 Fax: 21 3041233, e-mail.scomerciais@univete .pt

ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA.
Nocivo por ingestão ou inalação. Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. Pode provocar uma reação alérgica cutânea. Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Não respirar os vapores/aerossol. Usar luvas e vestuário de proteção adequados bem como proteção para os olhos/cara. Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. Em caso de ventilação inadequada, usar proteção respiratória. Evitar a libertação para o ambiente. Eliminar o conteúdo/ recipiente em conformidade com os regulamentos nacionais.

RECOMENDAÇÕES PARA CASOS DE INTOXICAÇÃO OU ACIDENTE.
A intoxicação pode produzir: de irritação a corrosão dos olhos, pele, mucosas, aparelho respiratório e gastrointestinal. Dermatite, cefaleia, asma, taquicardia, náuseas, vómitos, tosse, dificuldade respiratória, lágrimas, hipotermia. Depressão do SNC, hipotensão, convulsões, coma. Hemorragia, ulceração e potencial perfuração do estômago e esófago.

Primeiros Socorros: Retire a pessoa da zona contaminada. Tire a roupa manchada ou salpicada. EM CASO DE CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaugar. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaugar a pele com água/tomar um duche. EM CASO DE INGESTÃO enxaguar a boca. NÃO provoque o vómito. EM CASO DE INALAÇÃO: em caso de dificuldade respiratória, retirar a vítima para uma zona ao ar libre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.
Mantenha o paciente em repouso. Conserve a temperatura corporal. Controle a respiração artificial. Se a pessoa está inconsciente, deite-a de lado com a cabeça mais baixa que o resto do corpo e os joelhos semi-fletidos. Transporte o intoxicado a um centro hospitalar. Sempre que seja possível leve o rótulo ou a embalagem. Em caso de ingestão, avaliar endoscopia. Em caso de acidente/intoxicação efetuar o tratamento sintomático.
NÃO DEIXE O INTOXICADO SOZINHO EM CASO ALGUM.

EM CASO DE INTOXICAÇÃO, CONTACTO O CIAV-CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS: TEL: 808 250 143.

USO: EXCLUSIVAMENTE POR PESSOAL ESPECIALIZADO.

O PRODUTO BIOCIDA NÃO UTILIZADO OU OS SEUS RESÍDUOS DEVEM SER ELIMINADOS DE ACORDO COM OS REQUISITOS NACIONAIS A ELIMINAÇÃO DO PRODUTO DEBE ACAUTELAR A CONTAMINAÇÃO DE CURSOS E DE OUTRAS FONTES DE ÁGUA.

Manter a embalagem fechada em local fresco.

LOTE E VALIDADE: VER EMBALAGEM.

PERIGO