



1. Ficha Técnica

Intercid®

Características:

Intercid® é um desinfectante e um agente de limpeza para instalações de animais.

Composição: 1 Kg de concentrado líquido contém: 140 g formaldeído e 100 g glutaraldeído

Embalagem: Intercid® encontra-se disponível em embalagens de 1, 5, 10 e 120 kg.

Espectro de actividade:

- Eficácia comprovada contra bactérias, fungos e vírus
- Agente de limpeza altamente eficaz
- Pode ser usado em instalações ocupadas, se aplicado convenientemente
- Intercid actua contra vírus revestidos e não revestidos, bactérias, fungos pelo que combate os agentes causadores das seguintes doenças:
 - **Suínos:** Febre suína, Doença de Aujeszky, desinteria, Parvovirose porcina, enterotoxemia, FMD, doença da vesícula dos suínos;
 - **Bovinos:** Febre aftosa, IBR/IPV, BVD/MD, influenza bovina;
 - **Aves:** Doença de Marek, Gumboro, New Castle, Salmonelose, Bronquite infecciosa, Pasteurelose, Corisa aviária, Rinotraqueíte aviária;
 - **Equinos:** Influenza, Artrite infecciosa, Garrotilho, Poliartrite dos poldros e Salmonelose;
 - **Pequenos animais:** Parvovirose, Esgana felina (Panleucopenia), Rinotraqueíte felina, Leucose felina, Peritonite infecciosa felina, Esgana canina e Raiva.

Método de aplicação:

Intercid® é uma solução concentrada destinada a ser diluída em água.

A solução pronta-a-usar aplica-se por pulverização efectuada com equipamento de alta pressão (pulverizadores) ou esfregando as superfícies deixando-as húmidas.

Indicações:

Intercid®	Água	Solução pronta-a-usar
100 ml	10 litros	1 %



Desinfecção profilática:

Em instalações ocupadas pulverizar as superfícies exteriores dos estábulos, passagens, corredores e equipamento 3 vezes por semana.

Tempo de exposição: 1 hora

Desinfecção específica:

Pulverizar o chão, paredes e equipamento de instalações vazias, renovando o conteúdo do pulverizador 2 vezes por semana.

Tempo de exposição: 2 horas

Ação microbiológica:

Intercid[®] quando usado contra vírus envolvidos e não envolvidos, bactérias e fungos, deverá ser usado nas seguintes concentrações:

Bactericida:

Desinfecção profilática: 0,5% Tempo de exposição: 1 hora

Desinfecção específica: 1,0% Tempo de exposição: 2 horas

Fungicida:

1,0% Tempo de exposição: 2 horas

Virucida:

Efeito virucida limitado: 1,0% Tempo de exposição: 1 hora

Efeito virucida 1,0% Tempo de exposição: 2 horas

Instruções de utilização:

- Retire os animais
- Trate as instalações contra escaravinhos (se necessário)
- Retire os detritos da cama dos animais
- Retire o equipamento portátil
- Limpe a seco as instalações
- Limpe cuidadosamente com uma máquina de limpeza de alta pressão mais o detergente
- Deixe secar (pelo menos 3 horas)
- Volte a encher os pedilúvios ou tapetes
- Feche as portas das instalações, respiradouros, etc.
- Em caso de problemas de coccidiose, trate o chão e as paredes até 2 m de altura com Interkokask a 3% e deixe secar durante 3 horas. Aplique em seguida Intercid.
- Pulverize com Intercid o chão, paredes, tectos, ventiladores, entradas de ar, comedouros, bebedouros e equipamento que se encontram nas instalações desocupadas.
- Deixar secar durante pelo menos 2 horas ou, de preferência, de um dia para o outro.
- Prepare as instalações para voltar a introduzir os animais
- Introduza os animais



Desinfecção de rotina (sala de controlo/área de serviço):

Renove os pedilúvios pelo menos uma vez por semana ou mais vezes se contaminados com matéria orgânica.

Nota:

Intercid® pode ser aplicado utilizando pulverizadores de alta pressão numa proporção de 200 ml a 300 ml por m² usando um bocal de jacto de ângulo largo para 300 a 1000 psi.

Nome e endereço do importador e do representante comercial

TLH, Lda
Comercialização e distribuição de produtos
Prestação de serviços
Rua Beatriz Costa nº 2 A Alfragide
2610 - 195 Amadora Portugal
Tel + 351214718156
[http: www.tlh.pt](http://www.tlh.pt)
geral@tlh.pt

Ficha Técnica



